

УТВЕРЖДАЮ
Директор фирмы
«NATUR KRAUTER»
Вирендра Гупта

NATUR KRAUTER
Vill. Chhiddana
Delhi Road, Saharanpur
TIN No. 09/7150255

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Ливгрин (Livgreen) для улучшения вкусовых качеств кормов и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.
(организация - производитель: «NATUR KRAUTER »/ «НАТУР КРАУТЕР»,
Индия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Ливгрин - комбинированное средство из растительного сырья оказывающее мембраностабилизирующее, гепатопротекторное, антитоксическое, желчегонное и, в конечном итоге, общеукрепляющее действие и повышение продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.
2. В состав Ливгрин входят экстракты лекарственных трав (на 100 мл раствора):

Тепфросия Пурпура (Тепфросия пурпурная)	2 г
Fumeria Vailantil (Фумерия вайлантил)	7 г
Boehavia Diffusa (Берхавия раскидистая)	8 г
Solanum Nigrum (Паслен черный)	8 г
Eclipta Alba (Эклипта белая)	5 г
Andrographis Paniculata (Андрографис метельчатый)	8 г
Trachyspermum Ammi (Ажгон душистый)	2 г
Деминерализованная вода	Достаточное количество

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду добавка кормовая представляет собой жидкость коричневого цвета с ароматным запахом.
4. Выпускают расфасованным в пластмассовых флаконах по 1л, 5л т 20л. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием на русском языке: названия и адреса

организации-производителя, названия добавки, состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, срока годности, даты производства, условий хранения, рекомендации по применению, знака соответствия, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 10°C до 30°C.

Срок годности- 36 месяца со дня изготовления.

Не использовать по истечению срока годности.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Ливгрин - повышает потребление корма и усвояемость пищи, таким образом, вызывает:

увеличение надоев молока и яйценоскости у домашних птиц

стимулирует рост и набор массы тела

помогает клеткам печени нейтрализовать влияние афлотоксинов,

оказывает на организм анаболическое влияние

нейтрализует действие экзогенных токсинов, которые поступают в организм

вместе с лекарственными препаратами или из окружающей среды

может использоваться как основное средство защиты печени и стимулирование

роста организма

оказывает благоприятное действие на функцию желчевыводящих путей

регулирует деятельность кишечного тракта при появлении запоров

оказывает общеукрепляющее действие

Обеспечивает высокие темпы роста и развития, а также снижение затрат корма на единицу продукции.

III. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гепатит (острый и хронический)

Жировая дегенерация печени (гепатоз)

Другие поражения печени (лекарственные, токсические, метаболические)

Цирроз печени

Интоксикации организма, сопровождающиеся поражением печени

Заболевания желчного пузыря и желчных путей (холецистит и холангит)

Влияние афлатоксинов

Снижение защитных сил организма при заболеваниях печени

IV. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.

7. Применяют перорально с питьевой водой или кормом. Из-за растительного содержания препарата возможно незначительное количество осадка. Перед употреблением канистру рекомендуется взбалтывать.

Нормы ввода:

Технологические группы животных	Дозировка	Кратность применения
Сельскохозяйственные животные: а. Крупный рогатый скот, свиньи, лошади б. Телята, жеребята, поросята в. Овцы и козы	400мл на 10 голов 200-250мл на 10 голов 150-200мл на 10 голов	5-7 дней
Птица: а. Цыплята б. Молодняк в. Несушки и бройлеры г. Бройлер до 3-х недель д. Бройлер свыше 3-х недель до 6-й недели	0,8-1 л на тонну воды 0,8-1 л на тонну воды 1-2л на тонну воды 1л на тонну воды 1-2л на тонну воды	5-7 дней

8. Ливгрин совместим со всеми ингредиентами комбикормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

9. Побочных явлений и осложнений при использовании кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

10. Продукцию от сельскохозяйственных животных после применения Ливгрин можно использовать в пищевых целях без ограничений.

V. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.

11. При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. При попадании добавки на кожу следует смыть струей проточной воды, при попадании в глаза - немедленно промыть их водой и закапать 1-2 капли 30%- го раствора сульфацила натрия.

12. Ливгрин следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана организацией-производителем фирмой «NATUR KRAUTER», Индия

Адрес организации - производителя: НАТУР КРАУТЕР Д-9/Б, Индастриал Эстейт, Сахаранпур-247001, У.П. (Индия)

Регистрационный номер РК-ВП-3-2537-14 от 09 января 2014

Эксклюзивный дистрибьютор по СНГ и РФ, ООО «АБИОР ВЕТ КЭР»
129343, Россия, Москва, ул. Серебрякова проезд, д.14 Б, стр. 2